NOMBRE COMERCIAL





INGREDIENTE ACTIVO: COMPLEJO HORMONAL

REGIÓN: MX CLAVE: DB46

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO: RSCO - 472/XII/21

LICENCIA SANITARIA: 17 NV 11 011 22

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: BIORREGULADOR DE CRECIMIENTO

PRESENTACION: 250ml y 1L

HORMODUX[®] **forte** es un bioestimulante líquido de aplicación al follaje formulado con citocininas de alta eficiencia, las cuales contribuyen para acelerar la división celular (crecimiento de brotes nuevos y frutos) para obtener mayores y mejores cosechas. Se recomienda aplicar **HORMODUX**[®] **forte** en las etapas de mayor diferenciación y crecimiento celular para obtener el máximo potencial genético de nuestros cultivos.

HORMODUX[®] **forte** favorece la floración, se recomienda complementar con **Pkminplus**[®] para obtener un mayor crecimiento, tamaño y calidad del fruto.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

DETERMINACIÓN	RESULTADO %
Citocininas	1926.8 ppm

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

¿CÓMO ES?		
Color	Café	
Apariencia	Líquido	
Solubilidad	100%	
рН	7.0	
Densidad	1.2	



DOSIS DE APLICACIÓN

Cultivo	Época de Aplicación	L/Ha
Fresa, zarzamora, frambuesa y arándano.	Durante la brotación. Al inicio de la floración y amarre de frutos.	0.25 – 0.5
Naranja, limón y toronja.	Al inicio del desarrollo vegetativo, para uniformizar floración y amarre de frutos.	0.5 – 1.0
Melón, calabacita y sandia.	Al aplicar en desarrollo vegetativo al iniciar las guías. Al inicio de la floración y posteriormente al amarre de frutos para mejorar calibres.	0.25 – 0.5
Manzana, pera y durazno.	Al inicio de brotación y posteriormente en etapa de floración para incrementar cuaje y el tamaño del fruto.	0.5 – 1.0
Papaya, piña, plátano, mango y kiwi.	Al inicio del desarrollo vegetativo, en caso de piña para mejorar la forma y el tamaño del fruto.	0.5 – 1.0
Tomate y chile.	Inducir a la floración del desarrollo vegetativo. Repetir aplicación al inicio de floración para mejorar calibre, peso y calidad de la fruta.	0.5 – 1.0
Ornamentales: rosas, crisantemos y claveles.	Para inducir brotación.	0.5 – 1.0
Cebolla y ajo.	Aplicar cuando tenga 4 hojas verdaderas y repetir aplicaciones para mejorar el tamaño, forma y uniformidad del bulbo.	0.5 – 1.0



RECOMENDACIONES DE USO

Realizar las aplicaciones en horarios no calurosos. Si se realiza con avión, se disuelven los litros requeridos en la cantidad de agua que se utilice por hectárea. Aplicar por la tarde/noche o al amanecer sin que exista rocío sobre el follaje, antes de las horas críticas de mayor temperatura.

Se recomienda el uso de coadyuvantes, se puede mezclar con **Xpander Plus**® para mejorar la penetración. **NO** se debe aplicar cuando el cultivo se encuentre en un estado de estrés por sequías, granizadas, heladas, deficiencias nutricionales, enfermedades u otra causa.

ADVERTENCIAS DE USO

- Utilice el equipo de seguridad adecuado (overol, lentes, mascarillas). Evítese el contacto directo con la piel y los ojos.
- PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión, aplicar tratamiento sintomático.
- MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE: Disponga de los envases vacíos de acuerdo al reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de residuos peligrosos.
- No contamine cuerpos de agua, especialmente donde haya peces, o que se utilicen para consumo humano o como abrevaderos para ganado.
- ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No se almacene ni transporte junto a alimentos, ropa, forrajes. Almacénese en un lugar fresco y seco. No se deje a la intemperie.