



Líderes en Calidad de Resultados

NOMBRE COMERCIAL

BRASIME

INGREDIENTE ACTIVO: BRASSINOLIDE

REGIÓN: MX **CLAVE:** DB47

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO: EN TRAMITE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: BIORREGULADOR DE CRECIMIENTO

PRESENTACION: 250 ml y 1L

BRASIME® es un biorregulador de crecimiento orgánico de aplicación al follaje formulado con brasinoesteroides naturales, los cuales contribuyen en varios procesos metabólicos de las plantas para obtener mayores y mejores cosechas.

BRASIME® es un promotor natural de crecimiento al ser aplicado favorece la germinación de semillas, crecimiento de raíz, acelera el crecimiento e incrementa la resistencia a factores bióticos y abióticos en las plantas.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

DETERMINACIÓN	RESULTADO
Brassinolide	100 ppm

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

¿CÓMO ES?	
Color	Café
Apariencia	Líquido
Solubilidad	100%
pH	4.03
Densidad	1.05



Líderes en Calidad de Resultados

DOSIS DE APLICACIÓN

Cultivo	Época de Aplicación	L / Ha
Aguacate	Aplicar para incrementar cuaje, mejorar tamaño de fruto y obtener mayor calidad.	0.5 - 1.0
Fresa, zarzamora, frambuesa y arándano	Durante brotación. Al inicio de la floración y amarre de frutos.	0.25 - 0.5
Naranja, limón y toronja	Al inicio del desarrollo vegetativo, para uniformizar floración y amarre de frutos.	0.5 - 1.0
Melón, calabacita y sandía	Al aplicar en desarrollo vegetativo al iniciar guías. Al inicio de la floración y posteriormente al amarre de frutos para mejorar calibres.	0.25 - 0.5
Manzana, pera y durazno	Al inicio de brotación y posteriormente en etapa de floración para mejorar cuaje y el tamaño del fruto.	0.5 - 1.0
Papaya, piña, plátano, mango y kiwi	Al inicio del desarrollo vegetativo, en caso de piña para mejorar la forma y el tamaño del fruto.	0.5 - 1.0
Tomate y chile	Aplicar al inicio del desarrollo vegetativo. Repetir aplicación al inicio de floración para mejorar calibre, peso y calidad de la fruta.	0.5 - 1.0
Ornamentales: rosas, crisantemos y claveles	Aplicar al inicio del desarrollo vegetativo y posteriormente para inducir brotación de yemas laterales.	0.5 - 1.0
Cebolla y ajo	Aplicar cuando tenga 4 hojas verdaderas y repetir aplicaciones para mejorar el tamaño, forma y uniformidad del bulbo.	0.5 - 1.0

RECOMENDACIONES DE USO

Realizar las aplicaciones en horarios no calurosos. Si se realiza con avión, se disuelven los litros requeridos en la cantidad de agua que se utilice por hectárea. Aplicar por la tarde/noche o al amanecer sin que exista rocío sobre el follaje, antes de las horas críticas de mayor temperatura.

Se recomienda el uso de coadyuvantes, se puede mezclar con **Xpander Plus®** para mejorar la penetración.

NO se debe aplicar cuando el cultivo se encuentre en un estado de estrés por sequías, granizadas, heladas, deficiencias nutricionales, enfermedades u otra causa. **Siempre consulte a su técnico de confianza.**



Líderes en Calidad de Resultados

ADVERTENCIAS DE USO



Utilice el equipo de seguridad adecuado (overol, lentes, mascarillas). Evítese el contacto directo con la piel y los ojos.



PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión, aplicar tratamiento sintomático.



MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE: Disponga de los envases vacíos de acuerdo al reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de residuos peligrosos.



No contamine cuerpos de agua, especialmente donde haya peces, o que se utilicen para consumo humano o como abrevaderos para ganado.



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No se almacene ni transporte junto a alimentos, ropa, forrajes. Almacénese en un lugar fresco y seco. No se deje a la intemperie.

DuxBiotech®